Logo de l'établissement

réseau sécurité naissance
NAÎTRE ENSEMBLE

Commission des anesthésistes

Questionnaire d'anesthésie en obstétrique

Madame, Mademoiselle,
Ce questionnaire est destiné à préparer votre consultation d'anesthésie. Remplissez-le avec soin. Il vous sera réclamé par le médecin anesthésiste lors de la consultation d'anesthésie. Entourez la bonne réponse et précisez si besoin.
Apportez votre carte de groupe sanguin, vos ordonnances récentes et votre dossier médical si vous en possédez un.

Nom ..... Prénom..... Nom de jeune fille .....

Date de naissance ..... Profession .....

Poids avant grossesse ..... Poids actuel .... Taille .....

Terme prévu le ..... Nom de votre Obstétricien .....

Combien avez-vous d'enfants ? …… Vos accouchements se sont-ils bien passés ?... oui non

Avez-vous déjà eu une anesthésie péridurale lors d'un accouchement ? …… oui non

Avez-vous eu une anesthésie générale lors d'un accouchement ? …….. oui non

Avez-vous eu une ou des césariennes ?..... oui non

En quelle(s) année(s) ? ....

Avez-vous déjà eu une anesthésie locale ou générale ? …… oui non

Quand et pour quelle intervention ? …….

Vous a-t-on signalé un problème particulier ou une complication ? …… oui non

1. En dehors de la grossesse, avez-vous déjà consulté un médecin ou reçu un traitement pour un saignement prolongé / inhabituel (saignement de nez, petites coupures, ….) ? …… oui non
2. Avez-vous tendance à faire des bleus/hématomes de plus de 2 cm sans choc, ou très importants pour un choc mineur ? ……..... oui non
3. Avez-vous saigné de manière prolongée après extraction dentaire, (reconsulté un dentiste) ? … oui non
4. Avez-vous saigné de manière importante après une chirurgie ? …… oui non
5. Avez-vous consulté un médecin ou reçu un traitement pour des règles trop abondantes (pilule contraceptive, fer, autre traitement...) ? …… oui non
6. Avez-vous saigné de manière anormale après un accouchement ? oui non
   Avez-vous eu besoin de soins en urgence pour ce saignement ? oui non
   si oui lesquels ?…….……
7. Y-a-t-il des membres de votre famille proches atteints d'une maladie de la coagulation (hémophilie, Willebrand,….) ? …… oui non

Avez-vous déjà été transfusée ? …… oui non

Avez-vous de l'eczéma, de l'urticaire, un rhume des foins ? …… oui non

Etes-vous asthmatique ? …… oui non

Etes-vous allergique à certains médicaments ou aliments ou autre produit (latex) ? …….. oui non

Préciser ……..

Avez-vous (déjà eu) de l'hypertension artérielle ? ……..	oui	non
Avez-vous des problèmes cardiaques ? ……	oui	non
Préciser ……...		
Avez-vous des varices ? …….	oui	non
Avez-vous fait une phlébite, une embolie pulmonaire ? ……	oui	non
Si oui, en quelle circonstance après un accouchement, une intervention chirurgicale, une autre circonstance ? ……..		
Un de vos proches (père, mère, frère, sœur) a-t-il fait une phlébite, une embolie pulmonaire ? ……..	oui	non
Fumez-vous actuellement ? …….	oui	non
Fumiez-vous avant la grossesse ? ……..	oui	non
Portez-vous des lentilles de contact ? …….	oui	non
Portez-vous un ou des piercing(s) ? ……	oui	non
Avez-vous un appareil dentaire mobile, des dents sur pivot, un bridge? …….	oui	non
Avez-vous déjà consommé de la drogue ? ……...	oui	non
Avez-vous (eu) des problèmes respiratoires ? ……..	oui	non
Avez-vous (eu) des problèmes hépatiques ? …….	oui	non
Avez-vous (eu) des problèmes rénaux ? ……	oui	non
Avez-vous (eu) une maladie neurologique ou neuromusculaire (épilepsie, paralysie, SEP, coma, méningite, autre) ? ……..…..	oui	non
Préciser ……..……...		
Avez-vous (eu) des crises de migraine ? ……..	oui	non
Avez-vous (eu) des problèmes au niveau de la colonne vertébrale ? ……	oui	non
Avez-vous des problèmes de diabète ? …….	oui	non
Avez-vous des problèmes de thyroïde ? ……	oui	non
Avez-vous fait des crises de tétanie, de spasmophilie ? …….	oui	non
Prenez-vous des médicaments ? …….	oui	non
Préciser ……..		
Avez-vous des précisions à apporter ?	oui	non
…….		
…….		

Date

Signature

Références

Les points de 1 à 7 sont tirés de : Bonhomme F, Boehlen F, Clergue F. Evaluation per-opératoire de l'hémostase par l'anesthésiste : utilité d'un questionnaire standardisé. SFAR 2011, page 501

Evaluation préopératoire de l'hémostase par l'anesthésiste utilité d'un questionnaire standardisé

F. Bonhomme[1], F. Boehlen[2], F. Clergue[1]
1- Hôpitaux Universitaires de Genève, Anesthésiologie. 2- Hémostase, Genève, Suisse

Introduction : La détection d'une pathologie de l'hémostase lors de la consultation préanesthésique vise à prévenir les complications hémorragiques. Les performances du bilan standard d'hémostase pour prédire le risque de saignement sont mauvaises (sensibilité moins de 33%, spécificité de 84 à 99%, valeurs prédictives positives intérieure à 29% et négative de 74 à 99%). Le but de cette étude est de valider un questionnaire de diathèse hémorragique permettant de dépister les patients atteints d'un trouble de l'hémostase.

Matériel et Méthodes : Un questionnaire simple a été élaboré à partir de scores validés pour certaines coagulopathies:

1. Avez-vous déjà consulté un médecin ou reçu un traitement pour un saignement prolongé/inhabituel (saignement de nez, petite coupure….) ?
2. Avez-vous tendance à faire des bleus/hématomes de plus de 2cm sans choc, ou très importants pour un choc mineur?
3. Avez-vous saigné de manière prolongée après une extraction dentaire (reconsulté un dentiste) ?
4. Avez-vous saigné de manière importante après une chirurgie ?
5. Pour les femmes ; Avez-vous consulté un médecin ou reçu un traitement pour des règles trop abondantes (pilule contraceptive, fer, autre) ?
6. Avez-vous saigné après un accouchement?
7. Y a-t-il des membres de votre famille proche atteints d'une maladie de la coagulation (maladie de Wiflebrand, hémophAie, etc.) ?

Ce questionnaire a été appliqué à une population volontaire considérée a priori comme saine (sujets en bonne santé, n'ayant jamais consulté pour un problème de saignement) puis, de manière rétrospective, à tous les patients ayant consulté entre 2009 et février 2011 dans l'unité d'hémostase clinique pour une suspicion de diathèse hémorragique ou une complication hémorragique péri-opératoire (38 patients avec pathologie de l'hémostase identifiée sur 113 consultations). Chaque réponse positive compte 1 point. (analyse statistique entre les scores des différents groupes a été faite par le test de Kruskall Wallis.

Résultats

	Nombre de patients	Score médian (min - max)
Patients avec pathologie de l'hémostase	28	2 (1 - 6)
Patients symptomatiques sans anomalies de l'hémostase	75	1 (0 - 4)
Témoins sains	70	0 (0 - 2)

Les scores des 3 groupes sont statistiquement différents (p=0.0001). Les symptômes les plus retrouvés dans la population malade sont un saignement ayant entrainé une consultation médicale (63%), un saignement majeur lors d'une intervention chirurgicale (50%), des ménorragies (48% des femmes). Les symptômes les plus fréquents chez [es patients investigués sans anomalie de l'hémostase sont des ménorragies (49% des femmes), un saignement/hématome postopératoire (29%) et des bleus/hématomes pour des chocs mineurs (24%). Avec un seuil à 2, la sensibilité du questionnaire pour détecter les patients avec une pathologie à risque hémorragique est à 89.5% et la valeur prédictive négative à 96%.

Discussion : Ce questionnaire permet de dépister les patients potentiellement à risque hémorragique, la valeur seuil de 2 réponses positives devant conduire à une exploration de l'hémostase. Ce score est plus performant que le bilan d'hémostase standard habituellement prescrit. Il devrait maintenant être validé en consultation préanesthésique.

Références:
1.Ann Intern Med 2003;138:Wi5-W24;
2.J Thromb Haemost 2006;4 76673