

Critères d'inclusion

DANS LE RÉSEAU GRANDIR ENSEMBLE LE RÉSEAU DE SUIVI DES NOUVEAU-NÉS VULNÉRABLES EN PAYS DE LOIRE

Groupe A

- Prématurité ≤ 30SA
- OU Poids < 1250 g
- OU **Pathologie sévère**de la période néonatale
- OU Anomalies à l'examen neurologique à terme

Groupe B

Prématurité 31-33 SA

- OU Poids ≥ 1250 g et ≤ 1500 g
- OU **Pathologie modérée** de la période néonatale

Calendrier de surveillance :

Surveillance :

3 - 9 - 12 - 18 mois 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 ans Surveillance: B
3 - 12 mois

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 ans

Questionnaires Parents / Enseignants :

	18 mois	24 mois	3 ans	4 ans	5 ans	6 ans	7 ans
ASQ							
SDQ				-			
CHAT							
Questionnaire Enseignants							
Conners Parents / Enseignants							

Critères d'inclusion par la pathologie :

RESPIRATOIRE ET **CARDIO-VASCULAIRE:**

- Hypoxémie réfractaire
- Etat de Choc cardiogénique
- Etat de Choc hypovol / hémorragique
- Etat de Choc septique

NEUROLOGIQUE:

- Anomalies à l'examen neuro à terme
- H. Intraventriculaire III ou IV
- Encéphalopathie Anoxo Ischémique - Pathologie substance
- blanche
- Accident Vasculaire Cérébral
- Méningite bact ou virale



PATHOLOGIES CARDIAQUES:

- TGV
- Cardiopathie cyanogène sur obstacle droit:
 - Tétralogie de Fallot
 - Atrésie tricuspide
 - Maladie d'Ebstein
 - Double discordance
 - Ventricule unique
 - Ventricule droit à double issue (VDDI)
 - Tronc artériel commun
- CAV
- Cardiopathie sur obstacle gauche
 - Hypoplasie du cœur gauche
 - Retour veineux pulmonaire anormal (RVPA)
 - Sténose pulmonaire
 - Sténose aortique
 - Coarctation de l'aorte
 - Sténose mitrale
 - Interruption de l'arche aortique
- CEC en période néonatale

PATHOLOGIES PAROI:

- Hernie diaphragmatique
- Laparoschisis
- Omphalocèle
- Atrésie œsophage
- ECUN opérée

CRITÈRES ANTÉNATAUX :

- Malformation cérébrale :
 - Anomalie de corps calleux
 - Ventriculomégalie
 - Anomalie de la fosse postérieure
- Fœtopathie à CMV

NEUROLOGIQUE:

- Convulsions isolées hors EIA
- Hypotonie néonatale non expliquée

INFECTION:

- Infection virale (CMV, herpès) ou toxo
- Infection néonatale bactérienne précoce

EXPOSITION PRÉNATALE À L'ALCOOL PRÉOCCUPANTE AU-DELÀ DE 4SA :

- Quantité :
 - Au moins 1 verre par jour sur une semaine
 - 2 fois ou plus des occasions de plus de 4 verres
- Signes cliniques caractéristiques :
 - PC < -1,5DS
 - Dysmorphie
- Malformation cardiaque, fente LP, anomalies orthopédiques

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter : Mme Valérie ROUGER, cheffe de projet

06 72 04 57 75 - valerie.bureau@chu-nantes.fr